

SR/A. POUS BARRAL, JOSEP
FECHA: 11/04/2016 @
EXPL: RNM CADERAS
IND: Dr./a.

TÉCNICA DE ESTUDIO

Se realizaron secciones axiales y coronales a nivel de la cadera en secuencias ponderadas en los tiempos tisulares T1 y T2.

INFORME

Alteración de la señal de RM con edema óseo subcondral afectando a la región posterior de la cabeza femoral derecha y con extensión hacia el cuello femoral.

Cabeza femoral izquierda sin evidencia de edema óseo.

Discretos signos de capsulitis coxo femoral derecha.

Incipientes formaciones osteofitarias en los márgenes de la cabeza femoral derecha así como geodas óseas subcondrales con discreta hipertrofia sinovial a nivel del techo de la cavidad cotiloidea derecha.

Mínimos signos de bursitis pertrocanterea bilateral.

Resto de las estructuras visualizadas dentro de la normalidad.

CONCLUSIÓN

Edema óseo que afecta a la región posterior de la cabeza y cuello femoral derecho con discretos signos de capsulitis y derrame articular.

Signos degenerativos de la articulación coxo femoral derecha con pequeñas geodas óseas subcondrales en techo de cavidad cotiloidea.

Alteración de la señal de RM en la cabeza-cuello femoral izquierdo secundario a tunelización ósea a evaluar con los antecedentes del paciente.

Dr. J. Vives Roura
Nº Col. 27.016